

مرکز دندانپزشکی  
دکتر میلاد عشقی



# مراقبت‌های پس از درمان ریشه

۰۲۱-۴۰۷۷۱۹۹۲ 

۰۹-۱۹۹۹۹۱۱۹ 

dr.miladeshghi 

- تا 2 ساعت از خوردن غذای سفت با دندان درمان شده خودداری شود
- تا 24 ساعت از طرف مقابل برای خوردن غذا استفاده شود
- آنتی بیوتیک و داروی تجویز شده توسط پزشک کامل و سر ساعت استفاده شود چون درمان ریشه انجام شده، ترد و شکننده است و باید روکش شود. قبل از روکش با احتیاط از دندان استفاده شود
- به همراه درمان ریشه و ایجاد التهاب در اطراف ریشه دندان، شاهد وجود درد متعاقب قرارگرفتن دندان‌ها بر روی هم و یا درد خودبخود هستید، این علامت طبیعی بوده و پس از گذشت مدت زمانی بهبود می‌یابد. استفاده از ضد التهاب‌ها و مسکن به دنبال درمان روت کانال توصیه می‌شود
- اگر احساس کردید پانسمان یا پرکردگی موقت دندان شما بلند است به دلیل احتمال شکستن دندان جهت اصلاح آن به دندانپزشک مراجعه کنید
- بعد از اتمام درمان ریشه در اکثر موارد قسمت تاجی دندان پانسمان یا پرکردگی موقت می‌باشد که برای بازسازی قسمت تاج دندان باید درمان ترمیمی و یا پروتز انجام پذیرد
- لطفا شرایط بعد از درمان اندو دندان خود را با اندو دیگران حتی دندان‌های دیگر خود مقایسه نکنید چون عوامل مختلفی در بوجود آمدن این شرایط دخیل هستند که در صورت لزوم دندانپزشک شفاهی به شما توضیح خواهد داد
- در صورت بروز علائم آبرسه دندانی، بعد از درمان ریشه و مشاهده علائمی مانند پیشرفت آبرسه، تب، بی‌حالی و اشکال در بلع، استفاده سرخود از آنتی بیوتیک به هیچ وجه توصیه نمی‌شود. در صورت بروز این علائم باید در اولین فرصت به دندانپزشک معالج مراجعه کنید تا اقدامات درمانی لازم به عمل آید، زیرا باقی ماندن این حالت بسیار خطرناک است
- بخاطر داشته باشید بطور کلی همیشه درصدی شکست درمان در همه درمان‌های پزشکی وجود دارد که این درصد بدلیل شرایط خاص این بیماری تقریباً بالاست

