

مرکز دندانپزشکی  
دکتر میلاد عشقی



# مراقبت‌های پس از درمان ایمپلنت

۰۲۱-۴۰۷۷۱۹۹۲ 

۰۹-۱۹۹۹۹۱۱۹ 

dr.miladeshghi 

- سعی کنید تا 24 ساعت پس از جراحی استراحت کنید
- روز اول غذای سرد، نرم و سبک میل نمائید
- تف نکنید و در صورت نیاز به آرامی آب دهان خود را تخلیه کنید
- داروهای تجویز شده توسط دندانپزشک را طبق دستور استفاده نمائید و از مصرف خودسرانه دارو پرهیزید
- روز اول دهان را شستشو ندهید
- مشروبات الکلی مصرف نکنید
- تا یک هفته سیگار نکشید
- اگر در جراحی از بیهوشی استفاده شده به هیچ وجه رانندگی نکنید
- در صورت تجویز دهان شویه کلرهگزیدین، نخست مسواک زده سپس دهان را با آب نمک رقیق و گرم شستشو داده، آنگاه به مدت 30 ثانیه دهان شویه را در دهان غرغره نموده و بعد از بیرون ریختن آن تا 30 دقیقه از خوردن نوشیدنی یا غذا اجتناب کنید
- بعد از هر وعده غذایی با احتیاط مسواک زده و دهان خود را شستشو دهید
- تا یک هفته از فعالیت های سنگین و ورزشی پرهیزید
- 7-10 روز بعد، برای کشیدن بخیه ها به کلینیک مراجعه نمائید
- در صورت وجود جراحی ایمپلنت به همراه جراحی سینوس لیفت از فشار بر ناحیه بینی و دستگاه تنفسی خودداری کنید

#### عوارض احتمالی

- درد، تب و لرز خفیف (طبیعی است و از مسکن تجویز شده توسط دندانپزشک استفاده کنید)
- تراوش خونابه (طبیعی است و یک تکه گاز استریل را در محل قرارداده و 20 دقیقه فشار دهید)
- خونریزی (به کلینیک مراجعه نمائید)
- تورم (بعد از 24 ساعت ناحیه را کمپرس گرم نمائید)
- شل شدن قسمت خارج لثه ای (سریعا به کلینیک مراجعه کنید)

