


مرکز دندانپزشکی
دکتر میلاد عشقی



مراقبت‌های پس از درمان پروتز متحرک



۰۲۱-۴۰۷۷۱۹۹۲ 

۰۹۰۱۹۹۹۹۱۱۶ 

dr.miladeshghi 

- توصیه می‌شود که روزهای اول استفاده، حتی در هنگام خواب
- (به منظور عادت) دندان مصنوعی را خارج نکنید
- حداقل 2 بار در روز مسواک زده شود
- هنگام تمیز کردن پروتز، مراقب افتادن آن از ارتفاع باشید
- با مسواک مخصوص دندان مصنوعی، سطح داخل و خارجی پروتز و بایک
- مسواک بسیار نرم، لثه و مخاط داخلی دندان تمیز شود
- بعد از مسواک با تجویز پزشک، با استفاده از دهان شویه مانند آب نمک،
- سدیم فلوراید یا کلرهگزیدین دهان را ضد عفونی کنید
- قبل از خواب پروتز متحرک حتما برداشته شود
- هفته‌ای یکبار دندان مصنوعی را داخل یک محلول ضد عفونی کننده
- قرار دهید
- در صورت عدم استفاده پروتز در ظرف آب نمک قرار داده شود
- هنگام حمام کردن می‌توانید پروتز را داخل یک محلول تمیزکننده قرار
- دهید. محلول تمیز کننده را می‌توان با اضافه کردن یک قاشق چایخوری
- سرکه یا قرص مخصوص شستشوی پروتز با یک لیوان آب ولرم تهیه کرد.
- بعد از خارج کردن دندان مصنوعی از محلول تمیزکننده، آن را به طور
- کامل با آب شستشو داده سپس آن را داخل دهان بگذارید
- استفاده پروتز متحرک به مدت طولانی سایش دندان‌ها، تحلیل استخوان
- و لثه‌ها و گاه لقی و پوسیدگی دندان‌های پایه را به دنبال دارد که نیاز به
- ترمیم و تعویض پیدا می‌کند
- از وسایل فلزی جهت تمیز کردن فضای خالی بین دندان‌ها استفاده
- ننماید. همچنین استفاده از خلال چوبی نیز می‌تواند موجب تحلیل لثه
- شود
- در پروتز پارسیل متحرک، رعایت بهداشت دهان و دندان‌های باقی مانده
- الزامی است
- مراجعه مرتب بیمار به دندانپزشک و توجه به تذکرات وی توصیه
- می‌گردد

عوارض احتمالی

- زخم لثه، گونیه و زبان، تنگ یا گشاد بودن پروتز (در این صورت از هرگونه دستکاری خودداری کرده و جهت اصلاح و تعمیر به دندانپزشک مراجعه کنید)

